



2012年1月  
(12-010)

大塚製薬株式会社

抗精神病薬

## エビリファイ<sup>®</sup>OD錠3<sup>mg</sup> エビリファイ<sup>®</sup>OD錠6<sup>mg</sup> エビリファイ<sup>®</sup>OD錠12<sup>mg</sup> エビリファイ<sup>®</sup>OD錠24<sup>mg</sup>

### 近日発売のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、2012年1月18日に抗精神病薬エビリファイOD錠3mg・OD錠6mg・OD錠12mg・OD錠24mgの製造販売承認を取得し、近々発売させていただくことになりましたので、ここに謹んでご案内申し上げます。

本剤は、口腔内で速やかに崩壊することから唾液のみ（水なし）でも服用可能な製剤です。

今後とも、なお一層のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

#### ■ エビリファイOD錠3mg・OD錠6mg・OD錠12mg・OD錠24mgの製品概要

販 売 名	エビリファイOD錠3mg・OD錠6mg・OD錠12mg・OD錠24mg
剤 形	口腔内崩壊錠
有 効 成 分	アリピプラゾール
効 能 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統合失調症</li> <li>・ 双極性障害における躁症状の改善</li> </ul>
用 法 ・ 用 量	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 統合失調症 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</li> <li>● 双極性障害における躁症状の改善 通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。</li> </ul>
包 装	エビリファイOD錠3mg：[ブリスター]100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50) エビリファイOD錠6mg：[ブリスター]100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50) エビリファイOD錠12mg：[ブリスター]100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50) エビリファイOD錠24mg：[ブリスター]100錠(10錠×10)、500錠(10錠×50)
使 用 期 限	製造後2年6箇月
規 制 区 分	劇薬、処方せん医薬品* *：注意-医師等の処方せんにより使用すること
貯 法	室温保存(吸湿性を有するためブリスター包装のまま保存すること)



製造販売元  
大塚製薬株式会社

お問い合わせ先：信頼性保証本部 医薬情報センター  
0120-189-840 月～金 9:00～19:00(祝日を除く)